

PIKI INSEKTOV-INFORMACIJE



Piki os in sršenov so pogostejši poleti in jeseni, piki čebel so možni skozi vse leto, celo v toplejših zimskih dneh.

Kako ravnamo po piku? Kako zmanjšamo tveganje?

Spletna povezava: http://www.czs.si/Upload/Alergija_po_piku_zuzelk.pdf
(Ministrstvo za zdravje, Alergija za pike žuželk), 22.9.2016.

PIKI KLOPOV-INFORMACIJE



Pred pikom klopa se zavarujemo s primernimi oblačili in obutvijo ter uporabo repelentov (pršil, mazil proti klopom). Po vrnitvi iz gozda čimprej slečemo oblačila, natančno pregledamo telo, se oprhamo in čimprej sami odstranimo morebitne klope, saj s tem zmanjšamo možnost morebitne okužbe. Posebno pinceto za odstranjevanje kloпов je mogoče dobiti v lekarnah. Uporaba običajne pincete ni primerna, saj lahko možnost okužbe celo povečamo. Če telo okuženega klopa močno stisnemo, se sprostijo bakterije in virusi, ki so sicer v njegovem telesu in tako se poveča nevarnost vdora teh povzročiteljev v človekovo telo. S tako za odstranjevanje kloпов posebej prerezano pinceto klopa primemo čim bližje ustnemu delu in ga s počasnim, vendar vztrajnim vlečenjem izvlečemo, ranico in pinceto razkužimo in si umijemo roke. Klopa ne odstranjamo na silo, ker bomo pri tem odtrgali samo njegov zadnji del, kloпова glava z rilcem pa bo ostala v koži, kar lahko povzroči gnojenje. Preden se klopi pritrdijo, iščejo primerno mesto na telesu, zato ni nujno, da bodo že pritrjeni.

Vir: <http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/l-301-32.pdf>
(Združenje zdravnikov druž. medicine), 22.9.2016.